

## COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES – A – (XLCR)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

\*\*\*

*Toute affirmation doit être clairement et complètement justifiée.*

Soit  $n \geq 1$  un entier. On appelle *point entier* de  $\mathbb{R}^n$  un point dont toutes les coordonnées sont entières, c'est-à-dire un point de  $\mathbb{Z}^n$ . Si  $\mathcal{K}$  est une partie de  $\mathbb{R}^n$ , on note  $\overset{\circ}{\mathcal{K}}$  son intérieur. On appelle points entiers de  $\mathcal{K}$  (resp. points entiers intérieurs) les points de  $\mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^n$  (resp. les points de  $\overset{\circ}{\mathcal{K}} \cap \mathbb{Z}^n$ ). On note respectivement  $\text{Card}(\mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^n)$  et  $\text{Card}(\overset{\circ}{\mathcal{K}} \cap \mathbb{Z}^n)$ , le nombre (éventuellement infini) de points entiers de  $\mathcal{K}$  et de son intérieur  $\overset{\circ}{\mathcal{K}}$ .

Soit  $h_\beta$  l'homothétie de rapport  $\beta \in \mathbb{R}$  (centrée en 0), on note  $\beta\mathcal{K} = h_\beta(\mathcal{K})$  l'image de  $\mathcal{K}$  par  $h_\beta$ . Si  $\tau_x$  est la translation de vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$ , on note  $\mathcal{K} - x = \tau_{-x}(\mathcal{K})$  l'image de  $\mathcal{K}$  par  $\tau_{-x}$ .

Si  $M = (m_{ij})$  est une matrice de  $M_n(\mathbb{R})$ ,  $m_{ij}$  est le coefficient de la  $i$ -ème ligne et de la  $j$ -ème colonne.

On note  $(x_1 | \dots | x_n)$  la matrice de  $M_n(\mathbb{R})$  dont les colonnes sont les vecteurs  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ . On note  $I_n$  la matrice identité de  $M_n(\mathbb{R})$  et  $E_{ij}$  la matrice de  $M_n(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la  $i$ -ème ligne et  $j$ -ème colonne qui vaut 1.

On note  $M_n(\mathbb{Z})$  l'ensemble des matrices de  $M_n(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients sont entiers.

On note  $[a]$  la partie entière d'un réel  $a$  : c'est le plus grand entier inférieur ou égal à  $a$  ; et  $\{a\} = a - [a] \in [0, 1[$  la partie fractionnaire de  $a$ . On note  $\lfloor a \rfloor$  le plus grand entier strictement inférieur à  $a$ .

Pour des entiers  $a_1, \dots, a_k$  non tous nuls, on note  $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_k)$  le plus grand entier (strictement positif) qui divise tous les  $a_i$ .

**Première partie**

**1.** Soit  $M \in M_n(\mathbb{R})$  une matrice inversible et à coefficients entiers.

**1a.** Montrer que  $M^{-1}$  est à coefficients rationnels.

**1b.** Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

- i)  $M^{-1}$  est à coefficients entiers.
- ii)  $\det M$  vaut 1 ou  $-1$ .

Dans la suite, on note  $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$  l'ensemble des matrices carrées de taille  $n$  à coefficients entiers et de déterminant  $\pm 1$ . C'est un sous-groupe de  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ . On remarque que pour  $i \neq j$  et  $c \in \mathbb{Z}$ , la matrice  $I_n + cE_{ij}$  appartient à  $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ .

**2.** Soit  $M = (x_1 | \cdots | x_n) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ .

**2a.** Montrer que  $M \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$  si et seulement si  $M(\mathbb{Z}^n) = \mathbb{Z}^n$ .

**2b.** Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

i)  $M \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$ .

ii) Les points entiers du parallélépipède  $\mathcal{P} = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i x_i \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}, t_i \in [0, 1] \right\}$  sont exactement les  $2^n$  points  $\sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i$ , où  $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

**3.** Pour tout  $\alpha$  dans  $\mathbb{R}$  et pour tous entiers  $i$  et  $j$  distincts compris entre 1 et  $n$ , décrire l'effet sur une matrice carrée  $M$  de taille  $n$  de la multiplication à gauche par  $I_n + \alpha E_{ij}$ . Même question pour la multiplication à droite.

**4.** Soient  $n \geq 2$  et  $a_1, \dots, a_n$  des entiers non tous nuls. Le but de cette question est de montrer qu'il existe une matrice de  $M_n(\mathbb{Z})$  dont la première colonne est  $(a_1, \dots, a_n)$  et de déterminant le pgcd( $a_1, \dots, a_n$ ). Pour cela on raisonne par récurrence sur  $n$ .

Soit  $N \in M_{n-1}(\mathbb{Z})$  une matrice dont la première colonne est  $(a_2, \dots, a_n)$ . Étant donné  $u, v \in \mathbb{Q}$ , on considère la matrice

$$M = \left( \begin{array}{c|c} \begin{array}{ccc} a_1 & 0 & \cdots & 0 \end{array} & \begin{array}{c} u \\ va_2 \\ va_3 \\ \vdots \\ va_n \end{array} \\ \hline & N \end{array} \right).$$

**4a.** Exprimer  $\det M$  en fonction de  $\det N$ ,  $u$  et  $v$ .

**4b.** On suppose que les  $a_2, \dots, a_n$  sont non tous nuls et que  $\det N = \text{pgcd}(a_2, \dots, a_n)$ . Montrer que l'on peut choisir  $u, v$  de sorte que  $M$  réponde à la question.

**4c.** Conclure la récurrence.

**5.** Soit  $M \in M_n(\mathbb{Z})$ , de déterminant non nul. On souhaite montrer qu'il existe une matrice  $A$  dans  $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$  telle que  $MA$  soit triangulaire supérieure et en notant  $MA = (c_{ij})$ , on ait les inégalités  $0 < c_{11}$  et  $0 \leq c_{ij} < c_{ii}$  pour tous  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  tels que  $i < j$ .

**5a.** On note  $M = (x_1 | \cdots | x_n)$ . Soient  $x'_1, \dots, x'_n$  les éléments de  $\mathbb{Z}^{n-1}$  obtenus en prenant les  $(n-1)$  dernières coordonnées de  $x_1, \dots, x_n$ .

Montrer qu'il existe  $a_1, \dots, a_n$  dans  $\mathbb{Q}$ , non tous nuls, tels que  $\sum_{i=1}^n a_i x'_i = 0$ . Montrer que l'on peut choisir les  $a_i$  entiers et premiers entre eux dans leur ensemble.

**5b.** Montrer qu'il existe une matrice  $A_1$  dans  $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$  telle que la première colonne de  $\tilde{C} = MA_1$  ait tout ses coefficients  $\tilde{c}_{i1}$  nuls sauf le premier  $\tilde{c}_{11}$  que l'on peut prendre strictement positif.

**5c.** En considérant pour tout  $j = 2, \dots, n$  la division euclidienne  $\tilde{c}_{1j} = q_j \tilde{c}_{11} + r_j$ ,  $0 \leq r_j < \tilde{c}_{11}$ , montrer que l'on peut supposer  $\tilde{c}_{11} > \tilde{c}_{1j}$ , quitte à changer  $A_1$ .

**5d.** Conclure par récurrence.

**6.** Soit  $M \in M_n(\mathbb{Z})$ , de déterminant non nul. Montrer qu'il existe une matrice  $A$  dans  $GL_n(\mathbb{Z})$  telle que  $AM$  soit triangulaire inférieure et en notant  $AM = (c_{ij})$ , on ait l'inégalité  $0 \leq c_{ij} < c_{jj}$  pour tous  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  tels que  $j < i$ .

### Deuxième partie

Soient  $s_0, s_1, \dots, s_n$  des points de  $\mathbb{R}^n$  tels que les vecteurs  $s_1 - s_0, s_2 - s_0, \dots, s_n - s_0$  soient linéairement indépendants. On appelle *simplexe de sommets*  $s_0, s_1, \dots, s_n$  l'ensemble :

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \left\{ \sum_{i=0}^n t_i s_i \mid \forall i = 0, \dots, n, t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\} \\ &= \left\{ s_0 + \sum_{i=1}^n t_i (s_i - s_0) \mid \forall i = 1, \dots, n, t_i \geq 0, \sum_{i=1}^n t_i \leq 1 \right\}. \end{aligned}$$

Si de plus les  $s_i$  sont tous des points entiers, on dit que  $\mathcal{S}$  est un simplexe entier.

On définit le volume du simplexe  $\mathcal{S}$  de sommets  $s_0, s_1, \dots, s_n$  par

$$\text{Vol}(\mathcal{S}) := \frac{1}{n!} |\det(s_1 - s_0, s_2 - s_0, \dots, s_n - s_0)|.$$

**7.** Soit  $\mathcal{S}$  le simplexe de sommets  $s_0, s_1, \dots, s_n$ .

**7a.** Montrer  $\mathcal{S}$  est un compact convexe de  $\mathbb{R}^n$ .

**7b.** Montrer que  $\mathring{\mathcal{S}} = \left\{ \sum_{i=0}^n t_i s_i \mid \forall i = 0, \dots, n, t_i > 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\}$ .

En déduire que si  $0 \in \mathring{\mathcal{S}}$ , alors, pour tout  $\lambda \in [0, 1[$ ,  $\lambda \mathcal{S} \subset \mathring{\mathcal{S}}$ .

**7c.** Pour  $i = 0, \dots, n$ , on note  $\hat{s}_i = (1, s_i)$  le point de  $\mathbb{R}^{n+1}$  dont les coordonnées sont 1 suivi des coordonnées de  $s_i$ . Exprimer  $|\det(\hat{s}_0, \hat{s}_1, \dots, \hat{s}_n)|$  en fonction de  $\text{Vol}(\mathcal{S})$ .

En déduire que le volume d'un simplexe ne dépend pas de l'ordre des sommets.

**8.** Soit  $V \geq 0$  un réel.

**8a.** Donner un exemple de simplexe entier de  $\mathbb{R}^2$ , de volume supérieur ou égal à  $V$ , et n'ayant aucun point intérieur entier.

**8b.** Donner un exemple de simplexe entier de  $\mathbb{R}^3$ , de volume supérieur ou égal à  $V$ , et dont les seuls points entiers sont les sommets.

**9.** Soit  $\mathcal{K}$  un compact convexe de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $0 \in \mathring{\mathcal{K}}$ .

**9a.** Montrer que l'ensemble des  $\lambda \geq 0$  tels que  $-\lambda \mathcal{K} \subset \mathcal{K}$  est un intervalle.

On note

$$a(\mathcal{K}) = \sup\{\lambda \geq 0 \mid -\lambda \mathcal{K} \subset \mathcal{K}\}.$$

**9b.** Montrer que  $a(\mathcal{K}) < \infty$  et que  $a(\mathcal{K}) = \max\{\lambda \geq 0 \mid -\lambda \mathcal{K} \subset \mathcal{K}\}$ .

**9c.** Montrer que  $0 < a(\mathcal{K}) \leq 1$ .

En déduire que  $a(\mathcal{K}) = 1$  si et seulement si  $\mathcal{K}$  est symétrique par rapport à 0.

On admet le résultat suivant que l'on pourra utiliser sans démonstration pour la suite de cette partie.

**Théorème 1.** Soit  $\mathcal{S}$  un simplexe de  $\mathbb{R}^n$  et  $k$  un entier. Si  $\text{Vol}(\mathcal{S}) \geq k$ , il existe  $k+1$  points distincts  $v_0, \dots, v_k$  de  $\mathcal{S}$  tels que  $v_i - v_j \in \mathbb{Z}^n$  quels que soient  $i$  et  $j$  entre 0 et  $k$ .

**10.** Dans toute cette question,  $\mathcal{S}$  est un simplexe de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $0 \in \mathring{\mathcal{S}}$ . On veut montrer que

$$\text{Card}(\mathring{\mathcal{S}} \cap \mathbb{Z}^n) \geq 2 \left\lfloor \text{Vol}(\mathcal{S}) \left( \frac{a(\mathcal{S})}{a(\mathcal{S}) + 1} \right)^n \right\rfloor + 1.$$

On pose alors  $a = a(\mathcal{S})$ , et  $k = \left\lfloor \text{Vol}(\mathcal{S}) \left( \frac{a}{a+1} \right)^n \right\rfloor$ .

**10a.** Exprimer, pour  $\beta \in \mathbb{R}^*$  et  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\text{Vol}(\beta\mathcal{S})$  et  $\text{Vol}(\mathcal{S} - x)$ .

Montrer que pour  $\lambda \in [0, 1[$  suffisamment proche de 1,  $\text{Vol} \left( \frac{\lambda a}{a+1} \mathcal{S} \right) > k$ .

**10b.** Pour  $\lambda$  comme dans la question précédente, soient  $v_0, \dots, v_k$  les  $k+1$  points distincts dans  $\frac{\lambda a}{a+1} \mathcal{S}$  vérifiant  $v_i - v_j \in \mathbb{Z}^n$  pour tout  $i, j$  dont l'existence est assurée par le Théorème 1. Montrer que les points  $v_i - v_j$  sont dans  $\lambda\mathcal{S}$ . En déduire que les  $v_i - v_j$  sont dans  $\mathring{\mathcal{S}}$ .

**10c.** Montrer qu'il existe un indice  $j \in \{0, \dots, k\}$  tels que les  $(2k+1)$  points  $0, \pm(v_i - v_j)$ , pour  $i \in \{0, \dots, k\} \setminus \{j\}$  soient distincts. En déduire l'énoncé de la question **10**, puis que

$$\text{Card}(\mathring{\mathcal{S}} \cap \mathbb{Z}^n) \geq \text{Vol}(\mathcal{S}) \left( \frac{a(\mathcal{S})}{2} \right)^n.$$

### Troisième partie

On dit que deux simplexes  $\mathcal{S}$  et  $\mathcal{S}'$  de  $\mathbb{R}^n$  sont *équivalents* s'il existe un ordre d'énumération des sommets  $s_0, s_1, \dots, s_n$  de  $\mathcal{S}$ , et  $s'_0, s'_1, \dots, s'_n$  de  $\mathcal{S}'$ , et une matrice  $A$  de  $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$  tels que  $A(s_i - s_0) = s'_i - s'_0$  pour tout  $i = 1, \dots, n$ .

**11.** Montrer que deux simplexes entiers  $\mathcal{S}$  et  $\mathcal{S}'$  sont équivalents si et seulement s'il existe une matrice  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$  et un vecteur  $b \in \mathbb{Z}^n$  tels que  $\mathcal{S}' = A(\mathcal{S}) - b$ .

**12.** Montrer que le volume, le nombre de points entiers et le nombre de points intérieurs entiers sont les mêmes pour deux simplexes entiers équivalents.

**13.** Montrer qu'un simplexe entier  $\mathcal{S}$  est équivalent à un simplexe entier contenu dans le cube  $[0, n! \text{Vol}(\mathcal{S})]^n$ .

*On pourra utiliser la question 6 pour une matrice  $M$  bien choisie.*

On admet le résultat suivant que l'on pourra utiliser sans démonstration.

**Théorème 2.** *Pour tout entier strictement positif  $k$ , il existe une constante strictement positive  $C(n, k)$  telle que pour tout simplexe entier  $\mathcal{S}$  de  $\mathbb{R}^n$  possédant exactement  $k$  points intérieurs entiers,  $\text{Vol}(\mathcal{S}) \leq C(n, k)$ .*

**14.** Déduire du Théorème 2 que pour tout entier strictement positif  $k$ , il n'existe à équivalence près qu'un nombre fini de simplexes entiers de  $\mathbb{R}^n$  ayant exactement  $k$  points intérieurs.

### Quatrième partie

Le but de cette partie, qui ne faisait pas partie du sujet du concours, est de démontrer les Théorèmes 1 et 2 énoncés et utilisés dans les deuxième et troisième parties.

**15.** Soit  $\mathcal{S}$  un simplexe de  $\mathbb{R}^n$  et  $k$  un entier tel que  $\text{Vol}(\mathcal{S}) > k$ .

**15a.** Montrer qu'il existe  $x \in [0, 1]^n$  et  $(k+1)$  éléments de  $\mathbb{Z}^n$   $u_0, \dots, u_k$  tels que  $x \in \mathcal{S} - u_i$  pour  $i = 0, \dots, k$ .

*On pourra étudier les ensembles  $(u + [0, 1]^n) \cap \mathcal{S}$  quand  $u$  décrit  $\mathbb{Z}^n$ ; et admettre le fait – hors programme de CPGE – que le volume d'un simplexe est sa mesure de Lebesgue, qui est sous-additive.*

**15b.** En déduire l'existence des  $(k+1)$  points  $v_0, \dots, v_k$  qui satisfont aux conditions du Théorème 1.

**15c.** Montrer le Théorème 1, c'est-à-dire qu'ici, on suppose seulement que  $\text{Vol}(\mathcal{S}) \geq k$ .

**16.** Soient  $t_1, \dots, t_n$  des réels strictement positifs tels que  $\sum_{i=1}^n t_i = 1$  et soit  $N \geq n$  un entier. On souhaite montrer qu'il existe des entiers positifs ou nuls  $p_1, \dots, p_n$  et  $q$  tels que

i)  $1 \leq q \leq N^{n-1}$ ,

ii)  $\sum_{i=1}^n p_i = q$ ,

iii)  $|qt_1 - p_1| \leq \frac{n}{N}$ ,

iv) pour tout  $i = 2, \dots, n$ ,  $|qt_i - p_i| \leq \frac{1}{N}$ .

**16a.** En considérant les vecteurs de coordonnées  $(\{kt_2\}, \dots, \{kt_n\}) \in [0, 1]^{n-1}$  quand  $k$  décrit  $\{0, \dots, N^{n-1}\}$ , montrer qu'il existe des entiers  $p_2, \dots, p_n, q \geq 0$  vérifiant les conditions i) et iv).

**16b.** Conclure.

**17.** Le but de cette question est de montrer que quels que soient les entiers strictement positifs  $n$  et  $k$ , il existe une constante  $\alpha(k, n) \in ]0, 1[$  telle que, si  $t_1, \dots, t_n$  sont des réels strictement positifs vérifiant  $1 > \sum_{i=1}^n t_i > 1 - \alpha(k, n)$ , alors il existe des entiers positifs ou nuls  $p_1, \dots, p_n \geq 0$  et  $q$  tels que

$$\sum_{i=1}^n p_i = q > 0, \quad \text{et pour tout } i = 1, \dots, n, \quad (kq + 1)t_i > kp_i.$$

On procède par récurrence sur  $n$ .

**17a.** Traiter le cas  $n = 1$  en montrant que la constante  $\alpha(k, 1) = \frac{1}{k+1}$  convient.

On suppose l'énoncé vrai jusqu'au rang  $n - 1 \geq 1$ . En particulier,  $\alpha(k, n - 1) > 0$  est définie pour tout  $k \geq 1$ . On pose pour  $k \geq 1$

$$\alpha(k, n) = \frac{1}{4kN^{n-1}} \quad \text{où } N = 1 + \max\left(\frac{4k}{\alpha(k, n-1)}, 2kn(n+1)\right).$$

On se donne  $t_1 \geq t_2 \geq \dots \geq t_n > 0$ , et on suppose que  $\sum_{i=1}^n t_i = 1 - \alpha$  avec  $0 < \alpha < \alpha(k, n)$ .

**17b.** Si  $t_n < \alpha(k, n - 1) - \alpha$ , établir l'énoncé au rang  $n$ .

**17c.** Si  $t_n \geq \alpha(k, n-1) - \alpha$ , appliquer le résultat de la question **16** aux  $\frac{t_i}{1-\alpha}$ ,  $i = 1, \dots, n$ .  
Avec ses notations, montrer que

$$\alpha(k, n) < \min\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{2}\alpha(k, n-1)\right) \quad \text{et} \quad 1 - qk\frac{\alpha}{1-\alpha} \geq \frac{1}{2}.$$

Conclure en distinguant les cas  $i \geq 2$  et  $i = 1$ .

**18.** Soit  $\mathcal{S}$  un simplexe entier de  $\mathbb{R}^n$  de sommets  $0, s_1, \dots, s_n$  ayant exactement  $k$  points intérieurs entiers et soit  $x = \sum_{i=1}^n t_i s_i$  un point entier intérieur de  $\mathcal{S}$ .

**18a.** Montrer que  $\sum_{i=1}^n t_i \leq 1 - \alpha(k, n)$ . (On pourra raisonner par l'absurde et construire alors  $k+1$  points entiers distincts intérieurs à  $\mathcal{S}$ ).

**18b.** Montrer que  $\frac{\alpha(k, n)}{1 - \alpha(k, n)}x \in (\mathcal{S} - x)$ .

**18c.** En déduire que  $a(\mathcal{S} - x) \geq \frac{\alpha(k, n)}{1 - \alpha(k, n)}$ .

**19.** Conclure la preuve du Théorème 2.