

MATHÉMATIQUES II

Notations

On désigne par $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices à p lignes et q colonnes dont les coefficients sont des nombres complexes. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$ on note tA la matrice transposée de A , \bar{A} la matrice obtenue en conjuguant tous les coefficients de la matrice A et $\text{rg}(A)$ le rang de A .

On fixe un entier $n \geq 2$ et on considère $V = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, $E = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ munis des opérations usuelles. Les vecteurs nuls sont notés respectivement 0_V et 0_E .

L'espace vectoriel V admet pour base canonique

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $(k, m) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ on pose $E_{k,m} = e_k {}^t e_m$, ce qui donne une matrice à n lignes et n colonnes dont le coefficient d'indice (i, j) vaut 1 si $(i, j) = (k, m)$ et 0 sinon. La base canonique de E est constituée des n^2 matrices $E_{k,m}$, $1 \leq k \leq n$, $1 \leq m \leq n$.

On note I la matrice identité, $I = \sum_{1 \leq k \leq n} E_{k,k}$.

Si A est une matrice élément de E et W un sous-espace vectoriel de V , $A(W)$ désigne l'ensemble $\{Aw | w \in W\}$.

Si F est un sous-ensemble de E , on dit que W est stable par F si

$$\forall A \in F, A(W) \subset W.$$

Pour tout sous-ensemble \mathcal{L} de E on s'intéresse aux propriétés suivantes :

P_1 : \mathcal{L} contient (au moins) une matrice de rang 1,

P_2 : \mathcal{L} contient (au moins) une matrice de rang n ,

P_3 : \mathcal{L} contient I ,

P_4 : \mathcal{L} est un sous-espace vectoriel de E ,

P_5 : \mathcal{L} est stable par produit de matrices : $A, B \in \mathcal{L} \Rightarrow AB \in \mathcal{L}$,

P_6 : si W est un sous-espace vectoriel de V stable par \mathcal{L} , alors soit $W = \{0_V\}$ soit $W = V$.

Filière PC

Partie I - Étude de quelques exemples

I.A - Dans cette section I.A - , \mathcal{L} est l'ensemble des $A \in E$ qui sont inversibles :

$$\mathcal{L} = GL_n(\mathbb{C}).$$

I.A.1) Soit x un vecteur non nul de V . Montrer que pour tout vecteur y non nul de V il existe une matrice inversible A telle que $Ax = y$.

Indication : on peut considérer deux cas,

- a) la famille (x, y) est liée,
- b) la famille (x, y) est libre.

En déduire que la propriété P_6 est vérifiée par \mathcal{L} .

I.A.2) Indiquer celles des propriétés P_1, \dots, P_5 qui sont vérifiées par \mathcal{L} ; justifier les réponses.

I.B - Dans cette section I.B - , \mathcal{L} est l'ensemble des matrices $T = (t_{k,m}) \in E$ qui sont triangulaires inférieures, c'est-à-dire telles que

$$m > k \Rightarrow t_{k,m} = 0$$

I.B.1) Montrer que e_n est vecteur propre de tout $T \in \mathcal{L}$. Que peut-on dire de la propriété P_6 pour \mathcal{L} ?

I.B.2) Indiquer celles des propriétés P_1, \dots, P_5 qui sont vérifiées par \mathcal{L} ; justifier les réponses.

I.C - Dans cette section I.C - , $n = 2$ et \mathcal{L} est un sous-ensemble de E pour lequel P_3 et P_4 sont vérifiées.

I.C.1) On suppose que P_1 n'est pas vérifiée par \mathcal{L} (les matrices 2×2 de rang 1 appartiennent donc toutes à $E \setminus \mathcal{L}$ le complémentaire de \mathcal{L} dans E). Soit $A \in \mathcal{L}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Quelles sont les valeurs possibles du rang de $A - \lambda I$? Montrer que \mathcal{L} est l'ensemble des homothéties vectorielles.

I.C.2) On suppose que P_6 est vérifiée par \mathcal{L} . Montrer qu'alors la propriété P_1 est vérifiée par \mathcal{L} .

Dans toute la suite du problème, P_4 et P_5 sont supposées vérifiées :

\mathcal{L} est donc un sous-espace vectoriel de E stable par produit matriciel.

Partie II -

Dans cette partie, les propriétés P_3 et P_6 sont supposées vérifiées par \mathcal{L} (en plus de P_4 et P_5). On veut montrer qu'alors P_1 aussi est vérifiée.

On note

$$m = \min \left\{ \text{rg}(M) \mid M \in \mathcal{L} \setminus \{0_E\} \right\},$$

et on se propose de montrer que $m = 1$, ce qui établira P_1 .

On suppose dans un premier temps que $m \geq 2$. On note alors M_0 un élément de \mathcal{L} qui vérifie $\text{rg}(M_0) = m$ et on considère une base $(z_i)_{1 \leq i \leq m}$ de $M_0(V)$. On note x_1, \dots, x_m des éléments de V tels que $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $M_0 x_i = z_i$.

II.A - Montrer que $\left\{ N_{z_1} \mid N \in \mathcal{L} \right\} = V$.

On note alors N_0 un élément de \mathcal{L} qui vérifie $N_0 z_1 = x_2$ et on pose $M_1 = M_0 N_0 M_0$. Montrer que (M_0, M_1) est une famille libre.

II.B - Montrer que $M_0(V)$ est stable par $M_0 N_0$ puis que

$$\exists (\alpha, z) \in \mathbb{C} \times M_0(V), \text{ tel que } z \neq 0_V \text{ et } M_0 N_0 z = \alpha z.$$

En déduire que $0 < \text{rg}(M_1 - \alpha M_0) < \text{rg}(M_0)$.

Conclure que $m = 1$.

Partie III -

Dans cette partie on suppose que $n > 2$ et que la dimension de \mathcal{L} est supérieure ou égale à $n^2 - 1$. On veut montrer que P_3 et P_6 sont vérifiées, puis que $\mathcal{L} = E$, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'hyperplan de E stable par produit matriciel.

III.A - Soit W un sous-espace vectoriel de V stable par \mathcal{L} ; on note k la dimension de W . Montrer que $\{M \in E \mid M(W) \subset W\}$ est un sous-espace vectoriel de E qui contient \mathcal{L} et dont la dimension vaut $n^2 - k(n-k)$. En déduire que $W = \{0_V\}$ ou $W = V$. On a donc démontré P_6 .

III.B -

III.B.1) On suppose ici : $(*) \exists k, m \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, k \neq m \text{ et } E_{k,m} \in E \setminus \mathcal{L}$.

On note alors $\mathcal{H} = \text{Vect}(E_{k,m}, I)$ le sous-espace vectoriel de E engendré par $E_{k,m}$ et I .

Montrer que $\dim(\mathcal{H} \cap \mathcal{L}) \geq 1$ puis que \mathcal{L} contient une matrice inversible.

III.B.2) On suppose ici que c'est le contraire de (*) qui est vrai, donc

$$k \neq m \Rightarrow E_{k,m} \in \mathcal{L}.$$

Trouver une combinaison linéaire de ces $E_{k,m}$ qui donne une matrice inversible. En déduire que dans tous les cas \mathcal{L} contient une matrice inversible A .

III.C - Montrer que pour la matrice A définie ci-dessus, la famille $(A, A^2, \dots, A^{n^2+1})$ est une famille liée.

En déduire qu'il existe un entier $p > 0$ et des nombres complexes $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq p}$ tels que $\lambda_0 \lambda_p \neq 0$ et

$$\lambda_0 I + \lambda_1 A + \dots + \lambda_p A^p = 0.$$

Montrer alors que $I \in \mathcal{L}$.

On a donc démontré P₃.

Compte tenu de la partie II -, la propriété P₁ est donc satisfaite. On note alors M_0 une matrice de rang 1 qui appartient à \mathcal{L} , matrice que l'on peut écrire

$$M_0 = v_0 {}^t \bar{w}_0, \text{ où } v_0, w_0 \in V \setminus \{0_V\}.$$

On introduit le produit scalaire canonique sur V , $(v, w) \mapsto {}^t \bar{v} w$ et pour $v \in V$ on pose

$$A_v = \left\{ L v \mid L \in \mathcal{L} \right\},$$

$$B_v = \left\{ {}^t \bar{L} v \mid L \in \mathcal{L} \right\},$$

$$C_v = (B_v)^\perp.$$

III.D - Soit $u \in V$, $u \neq 0_V$. Montrer que C_u est un sous-espace vectoriel de V stable par \mathcal{L} et que B_u n'est pas réduit à $\{0_V\}$.

Montrer alors que $C_u = \{0_V\}$ et $B_u = V$.

Montrer que $A_u = V$. En déduire que pour tout $(x, y) \in V^2$ il existe $L, M \in \mathcal{L}$ tels que $L v_0 = x$ et ${}^t \bar{M} w_0 = y$, puis que toute matrice $A \in E$ de rang 1 appartient à \mathcal{L} . Montrer que $\mathcal{L} = E$.

••• FIN •••
